

INFECÇÕES DE REPETIÇÃO DERMATOLÓGICA IMUNOESTIMULAÇÃO INESPECÍFICA



Formulação

- Candidina
- Tricofitina
- Toxóide Estafilococcico
- Toxóide Estreptococcico
- Lisado de C.Parvum

Uso subcutâneo - AP



anthygenus.rio
anthygenus.com.br

(21) 2532-2224 / 3553-8732
atendimento@anthygenus.com.br
(21) 968-580-454 

ANTHYGENUS
Pesquisa e manipulação

INFECÇÕES DE REPETIÇÃO IMUNOESTIMULAÇÃO INESPECÍFICA

Candidina + Tricofitina + Toxóide Estafilococcico +
Toxóide Estreptococcico + C. Parvum

Forma Farmacêutica: Suspensão injetável.

Apresentação: Frasco-ampola de vidro âmbar com 5mL da suspensão em diluente AP (Ação Prolongada).

Princípio Ativo: Proteínas alergênicas de *Corynebacterium parvum* (*Propinumbacterium acnes*),
Toxóide Estafilocócico, Toxóide Estreptocócico, Candidina e Tricofitina.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Mecanismo de ação: A imunoterapia com esta composição é baseada na dessensibilização inespecífica e na imunomodulação, promovendo a produção de anticorpos para os principais agentes causadores de infecções dermatológicas de repetição. O paciente desenvolve proteção ativa contra as principais infecções e regula os mecanismos de tolerância imunológica. Esta formulação permite que os antígenos permaneçam mais tempo no organismo, sendo assim, os intervalos entre as aplicações podem ser maiores do que 7/7 dias, (esquema clássico).

Indicação: É utilizado como imunomodulador e dessensibilizante inespecífico. É indicado no tratamento de infecções cutâneas de repetição (por fungos ou bactérias), associadas à baixa imunidade (furunculoses de repetição).

Contra-Indicação: Não administrar durante estado febril, e em casos onde o paciente estiver sob tratamento de imunossupressores, radioterapia ou quimioterapia. E durante a gravidez e o período de lactação, não se recomenda a utilização.

Reações Adversas: Pode ocorrer eritema, vermelhidão, prurido e dor no local de aplicação, que deve desaparecer após algumas horas.

Posologia para Adulto: Aplicar por via subcutânea profunda em intervalos de 7 dias em doses começando com 0,5mL, e manter 0,5 mL até o término do conteúdo do frasco. Doses de Manutenção de 20/20 dias caso seja necessário.

Posologia Pediátrica: É Recomendável não exceder 0,2mL de 7/7 dias.
O volume a ser aplicado pode ser reconsiderado pelo médico, considerando considerando a gravidade da patologia e o peso do paciente.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

- * Armazenar sob refrigeração entre 2°C e 8°C, porta de geladeira. Nunca congelar.
- * Transporte na embalagem original ou caixa de isopor. O produto se mantém estável a temperatura ambiente (até 30°C) por até 48hrs.
- * O prazo de validade deste medicamento é de 12 meses, a partir da data de manipulação.



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Farm. Resp.: Anderson B. A. Matos - CRF-RJ - 11.837
Anthygenus Pesquisa Comércio e Manipulação
(21) 2532-2224 Whatsapp: 968-580-454
Av. Rio Branco, 277 - Sala 1108 Rio de Janeiro - RJ

AN THY GENUS
FOR FREE WORLD ALLERGY